

کم‌خونی و خطر کاهش شنوایی

کم‌خونی می‌تواند خطر کاهش شنوایی را افزایش دهد.

به گزارش ایسکانیوز، نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که از کاهش شنوایی می‌تواند با کم‌خونی فقر آهن - ترکیب کاهش سطح آهن و گلبول‌های قرمز خون - مرتبط باشد.

در این مطالعه آشکار شد که افراد مبتلا به کم‌خونی فقر آهن دو برابر بیشتر از افرادی که به این عارضه خونی دچار نیستند با خطر کاهش شنوایی مواجه می‌شوند.

ارتباط بین کاهش شنوایی و کم‌خونی فقر آهن به ویژه در مورد دو نوع اختلال کم‌شنوایی شامل کاهش شنوایی حسی - عصبی و کاهش شنوایی انتقالی قوی‌تر است.

کاتلین شیفر، نویسنده این مطالعه در دانشکده پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا در این باره گفت: در حال حاضر شواهدی وجود ندارد که تایید کند درمان کم‌خونی فقر آهن می‌تواند شنوایی را بهبود بخشد و یافته فوق فقط ارتباط احتمالی بین فقر آهن و کم‌شنوایی را نشان می‌دهد در حالی که ثابت نمی‌کند یکی، دلیل دیگری است.

به گزارش یونایتدپرس، به رغم دستیابی به نتایج فوق پزشکان معتقدند که انجام مطالعات بیشتر در این زمینه ضروری است.

منبع: ایسنا