



## آسپرین عامل توقف ابتلا به سرطان کبد در مبتلایان هپاتیت

محققان به رابطه بین مصرف آسپرین و کاهش ریسک ابتلا به سرطان پی برده اند.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از مهر، محققان تایوانی دریافته اند مصرف روزانه آسپرین ممکن است ریسک سرطان کبد را در افراد مبتلا به هپاتیت کاهش دهد.

هپاتیت با حمله به کبد می تواند موجب سیروز کبدی و سرطان کبد شود. مطالعه قبلی نشان داده است که مصرف روزانه آسپرین با دوز پایین ممکن است از سرطان پیشگیری کند.

محققان در این مطالعه داده های نزدیک به ۲۰۵ هزار بیمار مبتلا به هپاتیت مزمن را بررسی کردند. آنها دریافتند افرادی که روزانه آسپرین مصرف کرده بودند در طول ۵ سال مطالعه، کمتر از افرادی که آسپرین مصرف نکرده بودند، مبتلا به سرطان کبد شده بودند.

طبق اعلام محققان انجمن مطالعه بیماری های کبدی آمریکا، حدود ۲۴۰ میلیون نفر در سراسر دنیا مبتلا به هپاتیت مزمن هستند.

دکتر تنگ یو لی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: درحالیکه داروهای ضدویروسی به شکل قابل توجهی موجب کاهش ریسک سرطان کبد در افراد مبتلا به ویروس هپاتیت می شود، اما این ریسک را از بین نمی برد و برای همه مناسب نیست.